

	1987.46 femelle	1988.83 femelle	1989.22 mâle	1987.46 %	1988.83 %	1989.22 %
Distance de l'extrémité antérieure des mandibules :						
1 - au de fond de l'encoche médiane de la caudale	191	202	208	100,00	100,00	100,00
2 - à la pointe de l'aileron dorsal		119	126,5		58,91	60,81
3 - au centre de l'évent	28,5	28,7	30	14,92	14,20	14,42
4 - à la pointe du melon	10,2	10,7	11	5,34	5,29	5,28
5 - à la commissure labiale	27,5	27	27	14,39	13,36	12,98
6 - au centre de l'œil	32,5	30,5	32,5	17,01	15,09	15,62
7 - à l'insertion antérieure de la pectorale	48,5	47,5	45	25,39	23,51	21,63
8 - au centre de l'orifice génital *	131	137,8	129	68,58	68,21	62,01
Distance du centre de l'orifice génital * :						
9 - au centre de l'orifice anal	6,5	7,2	17,5	3,40	3,56	8,41
10- Hauteur de l'aileron dorsal à l'aplomb de la pointe	16,5	22,5	19,5	8,63	11,13	9,37
11- Longueur de l'aileron dorsal à sa base	27,5	28,5	31,5	14,39	14,10	15,14
12- Longueur de la pectorale	27	29,5	29,5	14,13	14,60	14,18
13- Largeur maximale de la pectorale	9	10,2	10,5	4,71	5,04	5,04
14- Largeur de la caudale de pointe à pointe	39	42,5	43,5	20,41	21,03	20,91
15- Largeur maximale de la caudale	40		45,5	20,94		21,87
* à ou de la partie antérieure du pénis						

Tableau 1 – *Stenella coeruleoalba* : dimensions externes en cm et valeurs en pourcentage de la longueur totale.